

PROCESBESCHRIJVING COMPLICATIeregISTRATIE perineurale injecties fenol, intramusculaire injecties botuline toxine

- Bij elke perineurale met fenol of intramusculaire injectie met botuline toxine dient het complicatieregistratieformulier te worden ingevuld.
- Men dient op de hoogte te zijn van het gebruik van anticoagulantia.
- De behandelend/superviserend revalidatiearts stelt de indicatie voor behandeling vast en informeert de patiënt over mogelijke complicaties. Hij legt dit vervolgens vast in de status, dan wel in het EPD.
- De patiënt of zijn vertegenwoordiger krijgt foldermateriaal m.b.t. de voorgestelde behandeling.
- Indien de patiënt of vertegenwoordiger akkoord is, kan direct dan wel op een speciaal spasticiteitspreekuur de injectie, lege artis, worden gegeven.
- Bij elke injectie dient het complicatieregistratieformulier te worden ingevuld en in de status te worden opgenomen, dan wel aan het EPD te worden toegevoegd. Er dient een archief of bestand aangelegd te worden van alle bovengenoemde ingrepen.
- Steeds dient maximaal 3 weken na de injectie een controle- of belafpraak te worden gemaakt om navraag te doen naar eventuele complicaties. Het daartoe bestemde deel van het complicatieregistratieformulier moet vervolgens worden ingevuld.
- Ten minste één keer per jaar wordt in het vakgroepoverleg en in het opleidingsoverleg (indien van toepassing) aandacht geschonken aan alle voorgekomen complicaties.
- Per vakgroep is een revalidatiearts verantwoordelijk voor de complicatieregistratie. Deze maakt op basis van alle complicatieregistratieformulieren jaarlijks een verslag. Dit wordt aan de vakgroep aangeboden ter bespreking. Daarop wordt een verbeterplan opgesteld als daar aanleiding voor is.
- Bij de kwaliteitsvisite worden de uitkomsten en verbeterplannen aangeleverd en besproken.

COMPLICATIETESTRATIEFORMULIER
Neurolyse / Neuromusculaire blokkade

Deel 1 - Patiëntgebonden gegevens:

Geslacht: m / v

Leeftijd:jaar

Batchnr.

Diagnose

- Spasticiteit bij Cerebrale parese
- Spasticiteit na CVA
- Spasticiteit bij MS
- Spasticiteit na traumatisch hersenletsel
- Spasticiteit bij dwarslaesie
- Anderszins:

Anti-stolling ja / nee

ja,

(Electief) stoppen anti-stolling ja / nee

Injectiegebonden gegevens:

Datum injectie :/...../.....

Aantal eenheden botulinetoxine

- Dysport.....
- Botox.....
- Anderszins

Aantal ml fenol:/ concentratie.....

Locatie:

- Arm/Hand
- Been

Neurolyse

- N.tibialis posterior
- N.obturatorius
- N.musculocutaneus
- Anderszins

Deel 2 - Complicaties *

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Geen | <input type="checkbox"/> Ernstige dysaesthesie, neuropathie |
| <input type="checkbox"/> Infectie | <input type="checkbox"/> Ademhalingsproblemen |
| <input type="checkbox"/> Allergische reactie | <input type="checkbox"/> Slikproblemen |
| <input type="checkbox"/> Anafylactische shock | <input type="checkbox"/> Functionele achteruitgang |
| <input type="checkbox"/> Ernstige gevolgen t.g.v. stoppen antistolling | <input type="checkbox"/> Overig |

* meerdere opties mogelijk