


▼ Trend prevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk

Prevalentie van angststoornissen 1991-2014



Bronnen: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg

- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)

EXPERTS EN REDACTIE ▾

BRONNEN EN LITERATUUR >

C.H. van Gool (RIVM)

M.J.J.C. Poos (RIVM)

Toename aantal mensen met angststoornissen

Het aantal patiënten dat in de huisartspraktijk geregistreerd is met een angststoornis, is in de periode 1991-2014 sterk gestegen, zowel voor mannen als voor vrouwen. De trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking ([standaardisatie](#)). Mogelijk herkennen huisartsen angststoornissen steeds beter. Ook zoeken mensen eerder professionele hulp bij klachten. Huisartsen herkennen en behandelen echter het grootste gedeelte van de angststoornissen nog niet ([de Graaf et al., 2010](#)).

Geen toe- of afname in bevolkingsonderzoek


Herhaald bevolkingsonderzoek in Nederland ([NEMESIS-2](#)) laat geen duidelijke toe- of afname van angststoornissen onder volwassenen van 18 tot 65 jaar zien ([de Graaf et al., 2012](#)). Herhaald bevolkingsonderzoek onder adolescenten en ouderen in Nederland ontbreekt, waardoor de ontwikkeling in deze groepen niet is vast te stellen.

Meer informatie

- [Definities angststoornissen](#)
- [Bronverantwoording angststoornissen](#)

▼ Trend nieuwe gevallen angststoornissen in de huisartsenpraktijk

Aantal nieuwe gevallen van angststoornissen 1991-2014



Bronnen: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg

- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)

EXPERTS EN REDACTIE ▾

BRONNEN EN LITERATUUR >

C.H. van Gool (RIVM)

M.J.J.C. Poos (RIVM)

Toename van mensen met nieuwe diagnose angststoornissen

Het aantal patiënten dat voor het eerst de diagnose angststoornis kreeg van de huisarts, is in de periode 1991-2014 sterk gestegen, zowel voor mannen als voor vrouwen. De trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking ([standaardisatie](#)). Mogelijk herkennen huisartsen angststoornissen steeds beter. Ook zoeken mensen eerder professionele hulp bij klachten. Huisartsen herkennen en behandelen echter het grootste gedeelte van de angststoornissen nog niet ([de Graaf et al., 2010](#)).

Meer informatie

- [Definities angststoornissen](#)
- [Bronverantwoording angststoornissen](#)