


▼ Trend in aantal mensen met contacteczeem

Trend in prevalentie van contacteczeem 1991-2014



Bron: RNH-Limburg

- 3-jaars voortschrijdend gemiddelde
- [Gestandaardiseerd](#) naar de bevolking van Nederland in 2010
- [Geïndexeerd](#) (1991 = 100)
- [ICPC-code 588](#)

EXPERTS EN REDACTIE ▼

M.J.J.C. Poos (RIVM)

Stijging aantal patiënten met contacteczeem

Het aantal patiënten met contacteczeem ([prevalentie](#)) is in de periode 1991-2014 gestegen. Voor mannen is de [prevalentie](#) met bijna 60% toegenomen en voor vrouwen is de [prevalentie](#) verdubbeld. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking ([standaardisatie](#)).

Mogelijk vertekend beeld van de stijging


Mogelijk is een deel van de stijging toe te schrijven aan de manier van registreren. De RNH-huisartsenregistratie werkt met zogenaamde probleemlijsten waarop over het algemeen alleen langdurige problemen worden geregistreerd. Het zou kunnen zijn dat personen na plaatsing op de probleemlijst, ondanks het verdwijnen van de klachten, toch op de lijst blijven staan. Dit kan een vertekend beeld van de stijging geven.

Meer informatie

- [Definities](#)
- [Bronverantwoording](#)
- [Methoden](#)

▼ Trend in aantal nieuwe gevallen van contacteczeem

Trend in aantal nieuwe gevallen van contacteczeem 1991-2014



Bron: RNH-Limburg

- 3-jaars voortschrijdend gemiddelde
- [Gestandaardiseerd](#) naar de bevolking van Nederland in 2010
- [Geïndexeerd](#) (1991 = 100)
- [ICPC-code 588](#)

EXPERTS EN REDACTIE ▼

M.J.J.C. Poos (RIVM)

Daling in aantal nieuwe gevallen van contacteczeem

In de periode 1991-2014 stijgen en dalen de incidentiecijfers voor contacteczeem. Deze schommelingen hebben waarschijnlijk te maken met het kleine aantal nieuwe gevallen dat gediagnosticeerd wordt met contacteczeem. Over de gehele periode is het aantal nieuwe gevallen van contacteczeem gedaald. Voor mannen daalde het cijfer iets meer dan voor vrouwen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking ([standaardisatie](#)).

Diverse ontwikkelingen beïnvloeden het aantal nieuwe patiënten

Diverse ontwikkelingen in de risicofactoren voor contacteczeem hebben in het verleden de trend in het aantal nieuwe patiënten beïnvloed. Zo zorgen ongunstige ontwikkelingen als toegenomen gebruik van zonnecrèmes, cosmetica, toiletartikelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor meer nieuwe patiënten. Door gunstige ontwikkelingen als verbetering in de samenstelling van cosmetica, toiletartikelen en sierraden en de verschuiving van ambachtelijke arbeidsprocessen naar geautomatiseerde productie zijn er juist minder patiënten.

Meer informatie

- [Definities](#)
- [Bronverantwoording](#)
- [Methoden](#)