


## ▼ Trend in prevalentie migraine

### Jaarprevalentie van migraine 1991-2014



Bron: RNH-Limburg

- De percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 = 100)
- ICD-code N89

### Prevalentie migraine gestegen

In de periode 1991-2014 is het aantal personen (prevalentie) met migraine bij de huisarts flink gestegen. Sinds 1990 is de prevalentie voor zowel mannen als vrouwen verdrievoudigd (RNFM, voorheen RNH-Limburg). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

#### Meer informatie

- Definities
- Bronverantwoording
- Methoden

EXPERTS EN REDACTIE ▼

BRONNEN EN LITERATUUR >


M.E.L. Bartelink (Julius Centrum)

M.J.J.C. Poos (RIVM)

P.E.D. Eysink (RIVM)

## ▼ Trend in aantal nieuwe gevallen migraine

### Aantal nieuwe gevallen van migraine 1991-2014



Bron: RNH-Limburg

- De percentages zijn 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 = 100)
- ICD-code N89

### Aantal nieuwe gevallen van migraine gestegen

Sinds 2010 is er een sterke stijging te zien in het aantal nieuwe gevallen van migraine. Voor mannen is de stijging groter dan voor vrouwen. Een belangrijke oorzaak van de stijging is een andere manier van registreren bij RNFM, voorheen RNH-Limburg. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

#### Meer informatie

- Definities
- Bronverantwoording
- Methoden

EXPERTS EN REDACTIE ▼

BRONNEN EN LITERATUUR >

M.E.L. Bartelink (Julius Centrum)

M.J.J.C. Poos (RIVM)

P.E.D. Eysink (RIVM)