


▼ Trend prevalentie reumatoïde artritis

Prevalentie reumatoïde artritis 1991-2014



Bron: RNH-Limburg, FaMe-net

- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)
- ICD₉-code L88

Stijging in het aantal patiënten met reumatoïde artritis

In de periode 1991-2014 is het aantal personen (prevalentie) met reumatoïde artritis (RA) flink gestegen. In beide registraties (FaMe-net, RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg) is voor zowel mannen als vrouwen een stijging te zien. De mate van stijging verschilt wel per registratie. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

- [Definitie](#)
- [Bronverantwoording](#)
- [Methoden](#)

EXPERTS EN REDACTIE ▼

BRONNEN EN LITERATUUR >


[S.J. van der Linden \(Maastricht UMC+\)](#)

[M.J.J.C. Poos \(RIVM\)](#)

[T. Hulshof, red. \(RIVM\)](#)

▼ Trend in aantal nieuwe gevallen reumatoïde artritis

Aantal nieuwe gevallen reumatoïde artritis 1991-2014



Bron: RNH-Limburg

- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)
- ICD₉-code L88

Stijging in het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten

In de periode 1991-2014 is een stijging te zien in het aantal nieuwe gevallen voor reumatoïde artritis in de RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg registratie. Bij de mannen is deze stijging hoger (35%) dan bij de vrouwen (20%). De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie).

Meer informatie

- [Definitie](#)
- [Bronverantwoording](#)
- [Methoden](#)

EXPERTS EN REDACTIE ▼

BRONNEN EN LITERATUUR >

[S.J. van der Linden \(Maastricht UMC+\)](#)

[M.J.J.C. Poos \(RIVM\)](#)

[T. Hulshof, red. \(RIVM\)](#)